

# Flagyl® 250 mg compresse

# Flagyl® 500 mg ovuli

## metronidazolo

### Categoria farmacoterapeutica

Antiprotozoari

Antimicrobici, antisettici ginecologici.

### Indicazioni terapeutiche

FLAGYL 250 mg compresse: Uretriti e vaginiti sintomatiche da *Trichomonas vaginalis*.

FLAGYL 500 mg ovuli: Trattamento topico delle vaginiti da *Trichomonas vaginalis*.

### Controindicazioni

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti, o ad altri derivati nitroimidazolici. Soggetti con discrasie ematiche o con malattie del S.N.C. in fase attiva. Gravidanza accertata o presunta. Allattamento.

### Precauzioni per l'uso

L'uso del prodotto deve essere limitato ai casi di *Trichomoniasi* sintomatica.

Usare con cautela in pazienti con gravi alterazioni della funzionalità epatica e renale.

Si consiglia un controllo clinico e laboratoristico (emocromo con formula leucocitaria) qualora fosse necessario protrarre il trattamento per più di 10 giorni.

### Interazioni

Informare il medico o il farmacista se sta assumendo o ha recentemente assunto qualsiasi altro medicinale, compresi quelli senza prescrizione medica.

E' sconsigliabile l'assunzione di alcool durante il trattamento in quanto l'associazione con metronidazolo può dare origine ad una sindrome disulfiram-simile con nausea, vomito e crampi addominali.

### Avvertenze speciali

Da usare sotto stretto controllo medico.

Durante il trattamento le urine possono assumere un colore rossiccio-marrone dovuto a pigmenti solubili del farmaco.

Il prodotto ha dimostrato proprietà cancerogena negli animali in particolari condizioni sperimentali.

### Gravidanza e allattamento

Chiedere consiglio al medico o al farmacista prima di prendere qualsiasi medicinale.

Il prodotto non deve essere somministrato in gravidanza accertata o presunta e durante l'allattamento.

### Effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari

L'impiego di Flagyl non altera la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari.

### Informazioni importanti su alcuni eccipienti

Le compresse contengono lattosio: se sapete di essere intolleranti a qualche zucchero consultate il vostro medico prima di assumere questo medicinale.

### Dose, modo e tempo di somministrazione

**Per via orale** (sia nella donna che nell'uomo). Studi recenti indicano come preferibile la somministrazione del metronidazolo in dosi non superiori ai 2 g, ossia 8 compresse ripartite opportunamente in 4 somministrazioni in una unica giornata.

**Per via vaginale** - 1 ovulo tutte le sere introdotto profondamente, per 10 giorni, senza interruzioni anche durante il periodo mestruale. L'impiego topico può essere usato come trattamento complementare risultando efficace ai fini di prevenire le recidive.

### Sovradosaggio

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di Flagyl avvertite immediatamente il medico o rivolgersi al più vicino ospedale.

**OFFERTO DA**  
**WWW.ACQUARIOFILI.COM**